

# КАКИЕ ПРИВИВКИ НУЖНЫ ВЗРОСЛЫМ ?

## КАЛЕНДАРЬ ВАКЦИНАЦИИ

### Вакцинация по Национальному календарю

(средства Федерального бюджета)

#### ГЕПАТИТ В

Взрослые от 18 до 55 лет,  
не болевшие и не  
привитые ранее против  
вирусного гепатита В  
(3 прививки: 0-1-6 мес)

#### КРАСНУХА

Женщины от 18 до 25 лет ),  
не болевшие и не привитые  
ранее (2 прививки: 0-3 мес)

#### КОРЬ

Взрослые от 18 до 35 лет ,  
взрослые от 36 до 55 лет,  
относящиеся к группам  
риска, не болевшие и не  
привитые ранее (2 прививки:  
0-3 мес)

#### ДИФТЕРИЯ, СТОЛБНЯК

Взрослые без ограничения  
возраста (3 прививки: 0-1-6 мес)

#### ГРИПП

Ежегодно перед началом  
сезона (группы риска)

### Вакцинация по эпидемическим показаниям

(средства Федерального бюджета, средства Областного бюджета, бюджет Муниципальных образований, средства граждан и другие источники)

#### КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ

Взрослые без  
ограничения возраста  
(3 прививки: 0-1-12 мес)  
Ревакцинация каждые 3  
года

#### ГЕПАТИТ А

Взрослые группы риска  
без ограничения возраста  
(2 прививки: 0-6 мес)

#### ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ

Взрослые группы риска  
без ограничения возраста  
(2 прививки: 0-12 мес)  
Ревакцинация каждые 5  
лет

#### МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ

Взрослые группы риска  
без ограничения  
возраста однократно

#### ВЕТРЯНАЯ ОСПА

Взрослые, относящиеся к  
группам риска ранее не  
привитые и не болевшие  
(2 прививки: 0-3 мес)

#### ШИГЕЛЛЕЗ

Ежегодно перед началом  
сезона (группы риска)

#### БРЮШНОЙ ТИФ

Взрослые без ограничения возраста  
группы риска (2 прививки: 0-1 мес),  
ревакцинация каждые 3 года

#### КОВИД

Взрослые без ограничения  
возраста группы риска, не  
болевшие и не привитые ранее

# ГРУППЫ РИСКА

## КОРЬ

Дети от 1 года до 17 лет (включительно), взрослые от 18 до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы); лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори.

## ГРИПП

Дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы); лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации; работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; государственные гражданские и муниципальные служащие; беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

## ГЕПАТИТ А

Лица, проживающие в регионах, неблагополучных по заболеваемости вирусным гепатитом А, а также лица, подверженные профессиональному риску заражения (работники сферы обслуживания населения, в т.ч. занятые в организациях торговли продуктами питания, работники предприятий общественного питания, работники, занятые на предприятиях пищевой промышленности, работники, обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети; работники пищеблоков различных учреждений, обслуживающих детское и взрослое население; работники детских дошкольных учреждений и работники учреждений с круглосуточным пребыванием детей).

Лица, выезжающие в неблагополучные страны (регионы), где регистрируется вспышечная заболеваемость вирусным гепатитом А. Контактные в очагах гепатита А (вне зависимости от возраста), население, проживающее на территориях, подверженных стихийным бедствиям (паводкам, стихийным бедствиям, крупным авариям на водопроводной и канализационной сети) по эпидемическим показаниям, лица, подверженные профессиональному риску заражения (медицинские работники, работники пищеблоков и работники, обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети медицинских организаций).

## ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ

Дети в возрасте от 2 до 17 лет включительно (ранее не привитые), взрослые, относящиеся к группам риска: лица, работающие в организациях социального обслуживания; лица, занятые на работах с вредными для дыхательной системы производствах; медицинские работники; лица, страдающие хроническими заболеваниями легких, органов сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, печени, почек, с иммуносупрессивными состояниями, онкологическими заболеваниями; лица, перенесшие COVID-19; реконвалесценты острого среднего отита, пневмонии, менингита; лица с иммунодефицитными состояниями, в том числе ВИЧ, онкологическими заболеваниями, получающие иммуносупрессивную терапию, в том числе кортикостероидами. Лица старше 60 лет, в том числе проживающие в организациях социального обслуживания; лица, подлежащие призыву на военную службу.

## ВЕТРЯНАЯ ОСПА

Дети и взрослые из групп риска ранее не привитые и не болевшие ветряной оспой: пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими, эндокринными расстройствами, нервно-мышечными расстройствами, муковисцидозом; больные острым лейкозом; пациенты, получающие иммунодепрессанты, длительно получающие системные стероиды пациенты, планируемые для проведения лучевой терапии; пациенты и воспитанники учреждений стационарного социального обслуживания с круглосуточным пребыванием; дети перед поступлением в детские дошкольные и школьные образовательные организации; дети, выезжающие на отдых в оздоровительные организации; женщины, планирующие беременность (не менее чем за 3 месяца); лица, подлежащие призыву на военную службу; медицинские работники; работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, прежде всего, с круглосуточным пребыванием обслуживаемых лиц. Лица, подлежащие призыву на военную службу и контактные из очагов ветряной оспы в медицинских организациях.

## МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ

Лица, подлежащие призыву на военную службу и контактные - (вне зависимости от возраста) с большим генерализованной формой менингококковой инфекции. В межэпидемический период иммунизации подлежат лица из групп высокого риска: - лица, выезжающие в эндемичные по менингококковой инфекции районы; - работники медицинских организаций инфекционного профиля; - медицинские работники и сотрудники лабораторий, лица, работающих с живой культурой менингококка; - пациенты, воспитанники и персонал учреждений стационарного социального обслуживания с круглосуточным пребыванием; - лица, проживающие в общежитиях; - лица, принимающие участие в массовых международных спортивных и культурных мероприятиях; - дети до 5 лет (включительно) и 13 - 17 лет (включительно); - лица старше 60 лет; - лица с первичными и вторичными иммунодефицитными состояниями, в том числе ВИЧ-инфицированные; - лица, перенесшие кохлеарную имплантацию; - лица с ликвореей.

## БРЮШНОЙ ТИФ

Лица, занятые в сфере коммунального благоустройства (работники, обслуживающие канализационные сети, сооружения и оборудование, а также организаций, осуществляющих санитарную очистку населенных мест, сбор, транспортировку и утилизацию бытовых отходов).

Лица, работающие с живыми культурами возбудителей брюшного тифа.

Население, проживающее на территориях с хроническими водными эпидемиями брюшного тифа.

Лица, выезжающие в гиперэндемичные по брюшному тифу страны (регионы).

Контактные лица в очагах брюшного тифа по эпидемическим показаниям.

По эпидемическим показаниям прививки проводят при угрозе возникновения эпидемии или вспышки брюшного тифа (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), а также в период эпидемии, при этом в угрожаемом регионе проводят массовую вакцинацию населения.

## ШИГЕЛЛЕЗ

Работники медицинских организаций (их структурных подразделений) инфекционного профиля. Население, проживающее на территориях, подверженных стихийным бедствиям (паводкам, стихийным бедствиям, крупным авариям на водопроводной и канализационной сети) по эпидемическим показаниям, работники пищеблоков и буфетных медицинских организаций. Лица, занятые в сфере общественного питания и коммунального благоустройства, работники молочно-товарных ферм, работники молокоперерабатывающих предприятий, работники пищеблоков различных учреждений, обслуживающих детское и взрослое население, работники предприятий торговли скоропортящимися продуктами питания, работники специализированных цехов по производству кулинарных изделий, воспитатели и помощники воспитателей детских дошкольных учреждений. Дети, посещающие дошкольные образовательные организации и выезжающие в организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых (по показаниям). Профилактические прививки предпочтительно проводить перед сезонным подъемом заболеваемости шигеллезами.